

SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA

Enunciado: Em pacientes portadores de ceratite ulcerativa superficial o tratamento em geral corresponde na eliminação da causa da úlcera, diminuição da dor, evitar o aprofundamento da úlcera e a não utilização de corticoides. Sabendo disso quais das opções abaixo é mais indicada para o controle da dor de um paciente canino com ceratite ulcerativa superficial diagnosticada pelo teste de fluoresceína.

Resposta: Para o controle da dor deve ser realizado colírios midriáticos cicloplégicos como atropina 1% e não devem ser usados anestésicos de superfície.

Enunciado: O tratamento da leptospirose canina baseia-se em terapia antimicrobiana específica e terapia de suporte. Sobre a terapia antimicrobiana de cães portadores de leptospirose, assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I – A terapia antimicrobiana é indicada tão logo possível, quando se suspeita de leptospirose.
- II – Penicilinas e derivados são utilizados com objetivo de interromper a leptospiremia e por apresentarem a capacidade de eliminar completamente os microrganismos albergados nos rins
- III – O uso da doxiciclina é recomendado, por promover rápida eliminação das leptospiros do tecido renal.
- IV – Os aminoglicosídeos são eficazes para depuração das leptospiros do parênquima renal, porém não devem ser administrados com essa finalidade até que os testes de função renal tenham retornado no valor de referência
- V – Enrofloxacin é um antibiótico altamente recomendado para pacientes portadores de leptospirose.

Resposta: Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas

Enunciado: A piometra por definição significa acúmulo de pús no lúmen uterino. É considerada uma doença do diestro, embora alguns animais em anestro possam apresentar a afecção. É uma afecção frequente na rotina de clínica médica de animais de companhia que pode levar o animal a morte. Sobre essa afecção assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I - É uma afecção mais frequente em cadelas do que em gatas
- II - Escherichia coli raramente é isolada a partir da cultura do conteúdo uterino de cadelas acometidas.
- III - Corrimento genital purulento, sanguineo, serossanguinolento ou mucopurulento são frequentemente observadas em cadelas com piometra de cérvix não aberta.
- IV - Manifestações clínicas como anorexia, poliúria, polidipsia, vômito, diarreia, letargia são frequentemente observadas em cadelas com piometra.
- V - Alterações laboratoriais como leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda, granulações tóxicas em neutrofilos, além de anemia normocítica normocromica e azotemia podem ser achados esperados em cadelas com piometra.

Resposta: Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

Enunciado: A respeito de urolitíases em cães e gatos, assinale a alternativa correta:

Resposta: O tratamento indicado para urólitos de urato são: aumento da ingestão hídrica, dieta específica restrita em purinas, alcalinização urinária e administração de alopurinol quando necessário

Enunciado: Um paciente canino, da raça Retriever do Labrador, fêmea, 06 anos, 28 Kg foi levado ao Hospital Veterinário de Pequenos Animais da UFRRJ por seu tutor que relatou histórico de apetite caprichoso, vômitos esporádicos e perda de peso nas últimas três semanas. Não sabe informar sobre urina e fezes pois a paciente vive solta em um quintal gramado junto com outros 4 cães de mesma raça. Nos últimos dois dias o tutor percebeu que a paciente está anoréxica, apática, vomitando frequentemente. No exame físico você observa 8% de desidratação, mucosas hipocoradas, 120pbm, 24mm e 38,5°C, sem alterações em ausculta cardíaca e pulmonar. Percebe presença de edema em todos os membros e ascite. Nos exames laboratoriais são encontrados anemia normocítica normocromica, linfopenia discreta, trombocitose, enzimas hepáticas dentro dos valores de referência, uréia e creatinina aumentados e albumina diminuída. A urinálise apresentou densidade urinária baixa e proteinúria (++) . Como base nessas informações, você já deve ter formulado suas hipóteses

diagnósticas. São exames relevantes para a conclusão diagnóstica e/ou condução desse caso clínico, EXCETO:

Resposta: Realização de ecodoppler cardiograma

Enunciado: Você está atendendo no Hospital Veterinário de pequenos animais, um paciente canino, sem raça definida, fêmea, 7 anos de 15Kg chamada Lili. A tutora, Dona Luísa, relata que Lili apresenta há 4 meses vários quadros de diarreia, vômitos esporádicos e perda de peso. Você pede que Dona Luísa descreva melhor como são esses episódios de diarreia. Ela relata que Lili faz de 3 a 4 defecações por dia, geralmente brilhantes e sem muco, as fezes são pastosas e muitas vezes com porções líquidas. A respeito desse quadro assinale a alternativa CORRETA:

Resposta: Considerando que o diagnóstico da Lili tenha sido supercrescimento bacteriano. O tratamento a ser preconizado é antibioticoterapia a base de metronidazol ou doxiciclina

Enunciado: A respeito da tríade felina, assinale a alternativa incorreta:

Resposta: Para o diagnóstico da tríade felina é necessário a comprovação de aumento na mensuração da imunorreatividade de anticorpos antitripsina e antitripsinogênio em gatos (fTLI)

Enunciado: *Diabetes mellitus* é uma condição em que ocorre diminuição da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Considerando as consequências da baixa ação da insulina, ocorre a hiperglicemia sustentada que é a principal causa das manifestações clínicas nos animais acometidos e por isso deve ser tratada para controle da doença. Sobre o tratamento da *diabetes mellitus* em cães assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I – O tratamento da *diabetes mellitus* não complicada inclui a aplicação de insulina, dieta adequada e exercício físico.
- II – A caninsulin[®] é uma insulina lenta, de formulação veterinária, suína e tem como característica evitar o efeito de hiperglicemia pós-prandial na espécie canina.
- III – A insulina NPH é uma insulina recombinante e tem ação ultra-rápida menos que 12h em cães.
- IV- A dieta de cães portadores de *diabetes mellitus* deve apresentar uma quantidade elevada de fibras pois promove redução de hiperglicemia pos prandial e restringe o aporte calórico, que auxilia a perda de peso em cães obesos
- V- Diferente dos humanos, nos pacientes caninos o exercício físico não contribui para o controle glicêmico

Resposta: Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas

Enunciado: O hiperadrenocorticismo (HAC) é a condição clínica resultante da produção excessiva de hormônios do córtex da adrenal, principalmente o cortisol. O excesso de cortisol circulante é responsável pela maior parte das manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes. Sobre o diagnóstico dessa afecção é correto afirmar que:

Resposta: O teste de supressão por baixa dose de dexametasona é o teste considerado mais sensível para o diagnóstico do HAC espontâneo

Enunciado: A transfusão de sangue é o procedimento pelo qual realiza-se a transferência do sangue total ou dos produtos sanguíneos de um doador para um receptor. Existem diferentes hemocomponentes que são utilizados dependendo da condição clínica do paciente. Sobre a escolha dos hemocomponentes sanguíneos e plasmáticos, assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I – O concentrado de hemácias é o principal hemocomponente para reposição de hemácias.
- II – A recomendação para o uso de sangue total fresco como primeira escolha são as anemias agudas, quando houver perda de mais de 50% do volume circulante total;
- III – O sangue total é a segunda opção para o tratamento de anemias, basicamente quando não houver alternativas.
- IV – A principal utilização do plasma fresco congelado é para correção de coagulopatias.
- V - Para a reposição de albumina podem ser utilizados o plasma fresco congelado e o plasma congelado, mas nesse caso, devem ser considerados apenas para terapia inicial de doenças crônicas.

Resposta: Todas as afirmativas estão corretas

Enunciado: Ao atender um paciente canino, sem raça definida, 40 kg, macho, castrado, com escore de condição corporal 7/9 com queixa de claudicação do membro posterior direito, você suspeita de doença articular degenerativa. Para o adequado diagnóstico assinale a alternativa que descreve a melhor abordagem diagnóstica:

Resposta: Histórico, exame físico e radiografia do local afetado

Enunciado: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do coração em realizar a sua função de bomba do sistema circulatório adequadamente. É uma síndrome frequentemente observada em cães da rotina clínica médica de animais de companhia. Sobre a ICC, assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I – Muitas manifestações clínicas da insuficiência cardíaca dependem do lado cardíaco comprometido. Outras resultam da insuficiência de baixo débito e não dependem do lado acometido
- II – As manifestações clínicas mais frequentes de ICC direita em cães são ascite, derrame pleural e edema de membros
- III – Em felinos as manifestações clínicas mais frequentes da ICC direita são ascite, edema de membros e efusão pericárdica.
- IV – A manifestação clínica da ICC esquerda de dispneia, ortopneia e tosse é frequente devido a presença de edema pulmonar
- V – Podem ser citadas como manifestações relacionadas ao baixo débito cardíaco em cães portadores de ICC a intolerância a atividade física, síncope e em casos mais graves choque cardiogênico.

Resposta: Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

Enunciado: Você atende um paciente canino, macho, castrado, 3 anos de idade, sem raça definida apresentando histórico de tosse esporádica há 2 meses, que nas duas últimas semanas se intensificou. Quando questionado sob o aspecto da tosse o tutor referiu que nessas últimas semanas a tosse antes seca, agora apresentava-se produtiva. Ao exame físico foi constatada temperatura retal de 38,5°C, frequência respiratória de 30 mrm, e frequência cardíaca de 120 bpm. A auscultação cardíaca apresenta-se sem alterações e na auscultação pulmonar presença de aumento de sons respiratórios principalmente na expiração. Auscultação traqueal sem evidências de alterações, no entanto o reflexo de tosse apresentou-se discretamente positivo. Com base no histórico acima, assinale a alternativa que melhor representa a suspeita clínica adequada, exame a ser solicitado e o tratamento recomendado.

Resposta: Bronquite. Radiografia de tórax. Uso de broncodilatador e glicocorticoides

Enunciado: A lateralização de cabeça é uma anormalidade neurológica comum em cães e gatos e indica a presença de uma lesão no sistema vestibular. Considerando a presença dessa alteração assinale a alternativa correta:

Resposta: A doença vestibular geriátrica canina (doença vestibular do cão idoso) é uma síndrome idiopática, e é uma causa comum de disfunção periférica unilateral aguda em cães idosos

Enunciado: Sobre o tratamento de infecções bacterianas na pele assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:

- I – Os tratamentos tópicos são utilizados para reduzir ou eliminar a bactéria população dentro e em redor de uma área de infecção e remover exsudados e resíduos de tecidos
- II – A remoção de resíduos de tecido (debris) é de suma importância no tratamento tópico porque permite o contacto direto do ingrediente ativo com o organismo.
- III- Agentes habitualmente utilizados no tratamento tópico de piodermites, incluem o uso: clorexidina, iodopovidona e peróxido de benzoíla.
- IV- Os agentes antibióticos sistêmicos são utilizados como tratamento padrão das piodermites, independente da gravidade da infecção.

Resposta: Somente as afirmativas I, II e III estão corretas

Enunciado: A escabiose canina é uma doença rotineiramente diagnosticada em cães. Sobre essa afecção assinale a alternativa incorreta

Resposta: O tratamento consiste no uso de ivermectina e moxidectina associadas além do uso de prednisolona e banhos com permanganato de potássio

Enunciado: A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as assertivas abaixo:

- I. A PNAB considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes.
- II. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- III. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- IV. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes de saúde.
- V. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Resposta: As assertivas I, II, III e V estão corretas.

Enunciado: A Portaria nº 782, de 15 de março de 2017 define a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. De acordo com essa Portaria, são considerados eventos de saúde pública, Epizootias de notificação compulsória imediata, exceto:

Resposta: arboviroses de importância em saúde pública (Encefalomielite Equina do Oeste, do Leste e Venezuelana, Oropouche, Mayaro)

Enunciado: De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são considerados Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- I. Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Hierarquização, Territorialização são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- II. Universalidade, Equidade, Integralidade são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- III. Somente a Universalidade, Equidade e Integralidade devem ser considerados na Atenção Básica.
- IV. Regionalização, Hierarquização, Territorialização, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade são consideradas as Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica.
- V. A participação da comunidade não deve ser considerada uma Diretriz a ser operacionalizada na AB.

Resposta: Somente as assertivas II e IV estão corretas

Enunciado: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

- II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social
- III. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outras funções: formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- V. Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS não precisam obedecer aos princípios de universalidade, integralidade e igualdade uma vez que apresentam autonomia.

Resposta: As assertivas I, II, III e IV estão corretas.